

1. Si presencia una Parada Cardiorrespiratoria (PCR), lo primero que debe hacer es llamar a los Servicios de Emergencia 091.
 - Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

2. Se entiende por Parada Cardiorrespiratoria la interrupción generalmente inesperada e irreversible, de la respiración y de la actividad mecánica del corazón.
 - Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

3. Con la RCP se pretende, primero reemplazar y después restablecer la respiración y la actividad del corazón.
 - Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

4. Para realizar una RCP básica es necesario contar con equipamiento específico, como mascarilla facial, oxígeno, ..
 - Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

5. Cuando el niño se encuentra en situación de PCR, presenta convulsiones e inconsciencia.
 - Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

6. Las causas por las que un niño puede sufrir una PCR son: Traumatismos (accidentes de tráfico, caídas, quemaduras), ahogamientos e intoxicaciones.
 - Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

7. La primera acción para comenzar la RCP en un niño es dar 5 ventilaciones de rescate antes de comenzar con las compresiones.
 - Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

8. La secuencia de compresiones/ventilaciones recomendada para la RCP Pediátrica Básica es 30/5.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
9. Después de realizar el primer ciclo compresión/ventilación, debemos comprobar si el niño tiene pulso y respira.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
10. Se deberá realizar la RCP sin interrupciones entre cada ciclo compresión/ventilación durante 2 minutos y después debemos reevaluar los signos vitales del niño.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
11. Si usted encuentra a un niño desmayado en el suelo, lo primero que debe hacer es iniciar las maniobras de RCP.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
12. Cuando el niño se encuentra en situación de PCR, los síntomas que presenta inconsciencia, apnea y ausencia de pulso o signos vitales.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
13. El masaje cardiaco o compresiones se deben realizar en el lado izquierdo del pecho, ya que es donde se encuentra el corazón.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
14. Para abrir la vía respiratoria del niño debemos inclinar la cabeza hacia atrás sujetando la frente y elevar la mandíbula.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

15. Para abrir la vía respiratoria de un niño que ha sido víctima de un accidente de tráfico, del que podemos sospechar lesión cervical, debemos inclinar la cabeza hacia atrás sujetando la frente y sostener la mandíbula hacia abajo.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
16. Para comprobar si un niño inconsciente respira, debemos poner el oído cerca del pecho para oír la respiración y ver si se eleva.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
17. Para saber si un niño inconsciente respira, debemos poner el oído cerca de su boca, ver, oír y sentir.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
18. Si el niño que se encuentra inconsciente pero respira de forma normal, debemos esperar la llegada de los profesionales sanitarios.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
19. Se dejarán de realizar las maniobras de RCP cuando el niño recupere signos de vida.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
20. Tras reconocer una Parada Cardiorrespiratoria, se debe iniciar de forma inmediata las maniobras de RCP ya que se incrementan las posibilidades de supervivencia.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
21. Tras reconocer una Parada Cardiorrespiratoria, las posibilidades de supervivencia dependen de la eficacia con la que se realizan las maniobras de RCP y no del tiempo que se tarda en iniciarlas.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

22. Si el niño se encuentra en el suelo y no nos habla, pero responde a estímulos (se mueve cuando le hablas, le tocas.), no hay que cambiarlo de posición, solo debemos observarlo continuamente y esperar a que se recupere o lleguen los Servicios de Emergencias.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
23. La maniobra de Heimlich (compresiones abdominales) no es un eslabón de la cadena de supervivencia.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
24. Los 4 eslabones de la Cadena de Supervivencia son: Reconocimiento precoz y pedir ayuda, RCP precoz, Desfibrilación precoz, Cuidados postresucitación.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
25. El masaje cardíaco o compresiones se deben realizar con los brazos ligeramente flexionados y las palmas de las manos sobre el pecho del niño.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
26. En un atragantamiento con obstrucción completa de la vía aérea, el niño NO puede hablar ni respirar, pero SÍ toser.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
27. En un atragantamiento parcial en el niño, el cual tiene una tos productiva y podemos ver el objeto que obstruye la vía aérea, debemos darle 5 palmadas en la espalda para ayudarlo a expulsarlo.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.
28. La maniobra de Heimlich se utiliza para la desobstrucción de la vía respiratoria cuando se produce un atragantamiento.
- Verdadero.
 - Falso.
 - No lo sé.

29. La maniobra de Heimlich se utiliza cuando en un atragantamiento el niño no puede toser ni hablar y está inconsciente.

- Verdadero.
- Falso.
- No lo sé.

30. Debemos realizar la maniobra de Heimlich cuando el niño está consciente y tiene unos tos productiva.

- Verdadero.
- Falso.
- No lo sé.